№ 18

Diverses observations pathologiques.

~~chute de vagin et de matrice~~

j'ai examiné sous les yeux de Mr. Verdier et de Mr. Barbeau la piece que j'ai eu l'honneur d'apporter à l'academie le 6 mai. elle renfermoit plusieurs maladies, entre autres, une chute du vagin et de la matrice, un polype à l'orifice de la matrice, et une cause de retention d'urine.

La tumeur que formoient le vagin et la matrice par leur chute s'echappoit à travers ~~les~~ grandes levres d'environ cinq à dix travers de doigt; elle etoit applatie de devant en arriere, elle paroissoit avoir deux pouces deux pouces et demi de diametre dans toute sa longueur elle etoit blanche à l'exterieure, la partie anterieure de cette tumeur etoit coupée par des rides transversales qui paroissoient être celle que forme la tunique nerveuse. ou la tunique interne du vagin; la partie posterieure etoit unie;

TENON

ARC 17
dr. 1 n° 18 p. 1

par enhaut la tumeur étoit continuë à la peau des grandes levres, et par enbas elle se terminoit par une ouverture ovale et transversale d'environ dix lignes sur son grand diametre et 4 ou cinq sur son petit.

Cette ouverture paroissoit être l'orifice de la matrice, elle donnoit naissance à un polype qui sortoit de sa partie posterieure en forme de langue, et qui l'excedoit d'environ un pouce.

le vagin et la matrice etant ouvert par le côté gauche depuis l'orifice jusqu'à la trompe, laissoient appercevoir des parois plus épaisses qu'elles ne devoient l'être. Ce qui nous donna occasion de rechercher d'ans leur épaisseur, nous decouvrimes dans la parois anterieure de la tumeure vaginale la partie posterieure du fond de la vessie qui sortoit par les grandes levres et les debordoit d'environ quatre travers de doigt, jusqu'à un travers de doigt de l'extremité la plus inferieure de la tumeur vaginale

ou elle etoit adherente entre le vagin
et la matrice

la parois posterieure de la tumeur —
vaginale etoit augmentée par la presence
du ligament large qui etoit descendu
double entre la matrice et le vagin
jusqu'à un travers de doigt de l'orifice
de la matrice.

Le Corps de la matrice etoit resté
dans le bassin plus bas que de coutume,
mais moins bas qu'on pourroit se le persuader
eu egard à la situation de ~~son orifice~~ l'ouverture qui
excedoit les grandes levres de cinq a six
travers de doit, et qu'on pourroit croire
être l'orifice même de la matrice, attendu
sa continuation avec la cavité de son
Corps si la distence qui se trouve entre
cette ouverture et le fond de la matrice
n'etoit pas si considerable. ce qu'il est
apropos d'observer c'est que la longueur —
accidentel que les parties ont acquise

ne paroît dependre que de l'allongement du col de ce viscere qui ~~a été~~ semble avoir prêté.

j'appris en ouvrant cette personne qu'elle avoit été attaquée d'une retention d'urine et qu'elle n'urinoit depuis longtems que par regorgement, je tournai mes vües sur la vessie, je la trouvai fort grande, elle étoit plaine, je la comprimai assez fortement sans qu'il en sortit une seule goute d'urine. je me persuadai alors que je rencontrerois un obstacle dans l'uretre, ce qui me determina à y porter la sonde, ce ne fut pas sans surprise que j'apperçus qu'elle y entroit aisement et que l'urine sortoit par la sonde avec facilité, je ne voulus pas vuider la vessie entierement, la sonde retirée, je comprimai la vessie une seconde fois, l'urine ne sortit pas plus que dans la premiere epreuve que j'avois faite, j'ouvris alors la vessie par

la partie superieure, en eloignant un peu
les parois de son col, je vis sortir de
dedans l'uretre un petit corps gros comme
un poix, il etoit libre par une de ses
extremitees, et adherent par l'autre à la
partie laterale droite du meat urinaire,
de consistence molasse, et d'une substance
qui nous a paru spongieuse, d'un rouge
foncé, environné de petits vaisseaux
variqueux, en introduisant la sonde
dans l'uretre, la partie libre de ce petit
corps avancoit dans la vessie et lors que
la sonde etoit retirée l'urine l'engageoit
de nouveau dans l'uretre en faisant
effort pour s'echapper. nous avons vu
ayant ouvert l'uretre par le côté que
ce petit corps le remplissoit exactement,
aussi l'urine ne sortoit elle depuis longtems
que difficilement. cet obstacle à l'issue
des urines avoit porté la vessie à se
dilater au point qu'elle avoit pu

descendre avec le vagin et la matrice jusqu'à quatre travers de doigt au dessous des grandes levres.

~~et~~ La femme qui portoit les maladies est morte âgée de plus de soixante ans a la suite d'une langueur de plusieurs années

j'ai trouvé depuis que j'ai eu l'honneur de faire voir les maladies à l'academie des observations qui semblent confirmer des soupçons que la premiere maladie m'avoit fait naître, j'attends pour en faire part à l'academie que de nouveaux faits me les confirme encore.